

4. Quais dos conjuntos de vetores dados são base de  $\mathbb{P}_2$ ?

a)  $v_1 = 1 - 3x + 2x^2$   
 $v_2 = 1 + x + 4x^2$   
 $v_3 = 1 - 7x$

$\mathbb{P}_2$  tem dimensão 3, um conjunto de 3 vetores é base se, e somente se, for linearmente independente.

$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -5 & 1 & -7 \\ 2 & 4 & 0 \end{bmatrix}$  Use linhas a determinante usando Sarrus

$$0 + (-12) + (-14) - (2 - (28))$$

$$-12 - 14 - 2 + 28 = 0$$

Desde assim,  $\det(A) = 0$ . Os vetores são linearmente dependentes, não formam base de  $\mathbb{P}_2$ .

10. Em cada parte, encontre o vetor de coordenadas de  $p$  em relação à base  $S = \{p_1, p_2, p_3\}$

a)  $p = 4 - 3x + x^2$   
 $p_1 = 1$   
 $p_2 = x$   
 $p_3 = x^2$

Cada polinômio pode ser expresso de forma única como combinação linear dos vetores de uma base.

$$\Rightarrow p = c_1(1) + c_2(x) + c_3(x^2)$$

$$4 - 3x + x^2 = c_1(1) + c_2(x) + c_3(x^2)$$

Vetor de coordenadas de  $p = 4 - 3x + x^2$  em relação a base é:

$$p = (4, -3, 1)$$

8. Encontre os dimensões dos seguintes subespaços de  $\mathbb{R}^4$ .

b) Todos os vetores da forma  $(a, b, c, d)$ , em que  $d = a + b$  e  $c = a - b$

$$(a, b, c, d) = (a, b, a - b, a + b)$$

agrupando por  $a$  e  $b$ :  $a(1, 0, 1, 1) + b(0, 1, -1, 1)$

Verificando a independência  $a(1, 0, 1, 1) + b(0, 1, -1, 1) = (0, 0, 0, 0)$

$\{(1, 0, 1, 1), (0, 1, -1, 1)\}$  é uma base do subespaço.

número de vetores na base = 2.

12. Em cada caso, encontre o vetor da base canônica de  $\mathbb{R}^3$  que pode ser acrescentado ao conjunto  $\{v_1, v_2\}$  para formar uma base de  $\mathbb{R}^3$ .

a)  $v_1 = (-1, 2, 3)$ ,  $v_2 = (1, -2, -2)$

Para um vetor de base canônica em  $\mathbb{R}^3$ , temos:  $e_1 = (1, 0, 0)$ ,  $e_2 = (0, 1, 0)$  e  $e_3 = (0, 0, 1)$ .

Desde assim:  $\{v_1, v_2, e_3\}$ , basta definirmos o determinante.

Com  $e_3$ :  $\begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 2 & -2 & 0 \\ 3 & -2 & 0 \end{bmatrix}$  Resolvendo com Laplace  $1 \cdot (-1)^{1+3} \cdot \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} = -4 - (-6) = 1 \cdot 2 = 2$

$\det \neq 0$ , um vetor que pode ser acrescentado é  $e_3 = (1, 0, 0)$

6. Considere os bases  $B = \{u_1, u_2\}$  e  $\tilde{B} = \{u_1, u_2\}$  de  $\mathbb{R}^2$ , em que

$$u_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad u_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \tilde{u}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \tilde{u}_2 = \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

a) Encontre a matriz de transição de  $B$  para  $B'$ .

$$P_{B \leftarrow B'} = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$

b)  $B$  para  $B'$

É a inversa de  $P_{B \leftarrow B'}$ . Então,  $P_{B' \leftarrow B} = \frac{1}{|J|} \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$

c) Calcule o vetor de coordenadas  $[w]_{B'}$ , em que  $w = \begin{pmatrix} 3 \\ -5 \end{pmatrix}$  e use (10) para calcular  $[w]_B$

$$\frac{1}{|J|} \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ -5 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 4 \cdot 3 + 3 \cdot (-5) = \frac{1}{|J|} (12 - 15) = -\frac{3}{|J|} \\ -1 \cdot 3 + 2 \cdot (-5) = \frac{1}{|J|} (-3 - 10) = -\frac{13}{|J|} \end{cases} = \begin{pmatrix} -\frac{3}{|J|} \\ -\frac{13}{|J|} \end{pmatrix}$$

d) Confira seu trabalho calculando  $[w]_B$  diretamente

$$\alpha \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -5 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 2\alpha - 3\beta = 3 \\ \alpha + 4\beta = -5 \end{cases}$$

$$\alpha = -5 - 4\beta$$

$$2(-5 - 4\beta) - 3\beta = 3 \Rightarrow -10 - 8\beta - 3\beta = 3 \Rightarrow -11\beta = 13 \Rightarrow \beta = -\frac{13}{11}$$

$$\alpha = -5 - 4 \left( -\frac{13}{11} \right) = -5 + \frac{52}{11} = -\frac{3}{11}$$